第2回メモリーサロン

前頭側頭葉変性症とは

神戸百年記念病院精神神経科認知症疾患医療センター

精神保健福祉士 篠原 隆宏

お話しをさせて頂く内容

1、前頭側頭葉変性症とはなんだろう?

2、症状について

3、どんな対応がよいだろう?

前頭側頭葉変性症


かつては、

前頭側頭型認知症やピック病と、主に呼ばれていた様子。

近年は研究が進み・・・

3タイプに分けられる

前頭側頭葉変性症



前頭側頭型 認知症

意味性認知症

進行性 非流暢性失語


認知症疾患の割合

前頭側頭変性

(その他中、約1~2%と 言われる)

男性と女性の発症割合に、大きな差はないとされている。

記憶障害が軽度の場合がある。



若年者(50~60代)に発症することが多いと 言われている。若年の中ではアルツハイマーの次に多い。

前頭側頭葉変性症

前頭葉や側頭葉を中心に委縮。 該当部位の脳機能が低下。

タンパク質であるタウ等が 脳に溜まり、脳委縮を起こす。 各症状は緩徐に進行する 傾向と言われている。

お話しをさせて頂く内容


1、前頭側頭葉変性症とはなんだろう?

2、症状について

3、どんな対応がよいだろう?

3タイプに分けられる

前頭側頭葉変性症



前頭側頭型 認知症

意味性認知症

進行性 非流暢性失語

前頭側頭型認知症

前頭葉は「理性、計画性」を司る。

側頭葉は「音や形、言葉の記憶や理解」を司る。

前頭葉

脳の前頭葉や側頭葉が委縮し、血流が低下することで起こる認知症。

側頭葉

常同行動・・・毎日、同じ時間に同じ行為を行う。



例: 決まった時間に毎日同じルートを散歩する。(時間割的)

常同行動

嗜好の変化







例: 同じ字を書き続ける。

甘い物ばかり食べる。 など

脱抑制的行動


・・・礼節や社会性の欠如から、 自己本位的や反社会的な行動に



例:赤信号であっても、何の気もなく無視する。 万引き行為や痴漢行為に至るケースもある。

3タイプに分けられる

前頭側頭葉変性症




前頭側頭型 認知症

意味性認知症

進行性 非流暢性失語

意味性認知症

特に左側頭葉は「言葉の記憶や理解」を司る。



左の側頭葉が萎縮することで起こる認知症。

左側頭葉

言葉の意味や名称、理解に関する障害



例:知っている物を見たり言葉を聞いても、名前が分からない。

言葉の意味や名称、理解に関する障害



たんし さんかづき ひわ

団子 三日月 日和

例:文字の読み間違いが多くなる。

言葉の意味や名称、理解に関する障害

犬も歩けば棒に当たるの意味はなんでしょうか?




犬も歩けば棒に当たること。

例:質問を理解して答えることが困難。

3タイプに分けられる

前頭側頭葉変性症




前頭側頭型 認知症

意味性認知症

進行忹 非流暢性失語

進行性非流暢性失語

左中心前回は、脳部位の様々な範囲と接する。「言葉の組立、発語」等に関わると言われる。



左中心前回


左中前頭回という部位が関わることも。

左中心前回などが萎縮することで起きる症状と示されるデータもある。

言葉の意味の理解は概ね保たれる。

発語失行

•••たどたどしい発話となる。



単語は分かるが、言葉がスムーズに出てこない。

失文法

•••正しい文章で話せない。

「私は寝返りを打った。」と言いたい。



長い文や複雑な文になるほど、より症状が顕著。



1、前頭側頭葉変性症とはなんだろう?

2、症状について

3、どんな対応がよいだろう?

どんな対応がよいだろう

常同行為

対応

・同じ時間に出歩く

例:無理に引き止めない。

... 例:午後3時はおやつの時間

と決めて戻ってきてもらう。



環境を整える対応

常同行為は デイサービスが有効となりえる。

デイサービス時間割 例

10時 レクリエーション

11時 入浴

12時 昼食

13時 レクリエーション

14時 自由活動

15時 お菓子

普段の決まった 行動の時間を デイサービスで 過ごしてもらう。

どんな対応がよいだろう

口唇傾向

対応

目についた物を口にふくむ行為

例:食べては危険なものを ・・近くに置かない(洗剤など)







どんな対応がよいだろう

意味性認知


言葉の意味が分からない 物の名前が出ない, 文字を読み違う 対応

例:本人が認識できる手段で。

言語リハビリテーション

文字に書いて、質問してみる。





前頭側頭葉変性症 まとめ

- 若年(50代~60代)で発症することが多い。
- ・「前頭側頭型認知症」、「意味性認知症」、 「進行性非流暢性失語症」の3タイプに現在分けられる。
- ・常同行為、嗜好変化や、反社会的行動、言語障害などが 特徴。
- ・例:常同行為の特徴から、 デイサービス等を始めとした見守りあるサポートの中で、 本人の過ごしやすい時間割を考える。

身近な人の様子を相談したい

- 〇自宅地域のあんしんすこやかセンター
- 〇かかりつけ医療機関の担当医師
- 〇認知症疾患医療センター (神戸市内では7か所の医療機関に設置)